


PARTICIPEZ À L'INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ DU CAPCIR

Ordre des Lépidoptères



Août 2026



Apollon – *Parnassius apollo*



© Loan ARGUEL

Espèce protégée, à ne pas manipuler

Morphologie

L'Apollon est un des plus grands papillons de France (d'une envergure de 6 à 9 cm). Les ailes ont un fond blanc à crème. Les ailes antérieures présentent plusieurs taches noires [A], les ailes postérieures présentent deux ocelles rouges cernés de noir [B]. La chenille se nourrit exclusivement de sédums.

Habitat

Pelouses, prairies et pentes rocheuses fleuries entre 400 et 2 700 mètres d'altitude.

Période

Visible de mai à août, parfois en septembre.



Avec le soutien financier de



Comportement

Vol planant, plutôt lent, adapté aux milieux ouverts.

Très vulnérable au changement climatique, et aux activités humaines.

Le saviez vous ?



© Benjamin ALLART


L'Apollon passe tout l'hiver à l'état d'œuf, niché dans la végétation. L'œuf résiste au gel et à la neige pendant plusieurs mois avant d'éclore au printemps.

Contribuez au suivi de la biodiversité locale en partageant vos données sur l'application **NaturaList**



PARTICIPEZ À L'INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ DU CAPCIR


Ordre des Lépidoptères



Août 2026



Machaon – *Papilio machaon*



Morphologie

Le Machaon est un grand papillon (envergure jusqu'à 9 cm). Les ailes sont jaunes avec des stries noires. Les ailes postérieures présentent une tache rouge chacune, avec des lunules bleues. La chenille est facilement reconnaissable : verte tachetée de noir et d'orange. Elle se nourrit que de plantes de la famille des Ombellifères.

Habitat

Se rencontre dans les milieux ouverts (prairies, pelouses, jardins, potagers, ...), jusqu'à 2 700 mètres d'altitude.

Période



La Machaon s'observe d'avril à septembre.

Comportement


Le vol est puissant et très planant, ce papillon peut parcourir de longues distances. Il butine de nombreuses fleurs.

Le saviez vous ?

Lorsque la chenille se sent menacée, elle déploie derrière sa tête un petit organe orange vif et malodorant appelé osmeterium. Cela imite une glande à venin et suffit à effrayer la plupart des prédateurs !

PARTICIPEZ À L'INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ DU CAPCIR

Ordre des Lépidoptères



Août 2026



Morio – *Nymphalis antiopa*

© Jean-Marc LEWIN



© Jean-Marc LEWIN



Morphologie

Le Morio est un grand papillon (d'une envergure de 6 à 8 cm), que l'on reconnaît facilement par ses ailes brunes bordées de jaunes et de points bleus. C'est un papillon capable de parcourir de grandes distances.

Habitat

Il fréquente les milieux boisés, principalement de bords de rivières, étant en partie lié aux saules.

Période



Ce papillon s'observe très longtemps durant la saison : de mars à octobre.

Comportement

Vol puissant et rapide, souvent observé en train de planer haut dans le feuillage, mais il descend régulièrement se poser sur les troncs ou au sol par beau temps. Il se nourrit surtout de sèves, de fruits fermentés et de miellat, plutôt que de nectar.

L'espèce est en déclin en France.


Le saviez vous ?

Contrairement aux autres papillons, le Morio hiberne à l'état adulte (dans une cavité d'arbre, tas de bois).

PARTICIPEZ À L'INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ DU CAPCIR

Août 2026

Ordre des Lépidoptères



Semi-apollon – *Parnassius mnemosyne*



© Benjamin ALLART

Espèce protégée, à ne pas manipuler

Morphologie

Le Semi-Apollon est un papillon de taille moyenne (envergure autour de 3 cm). Les ailes sont blanches translucides, avec des nervures noires. Les ailes antérieures présentent deux tâches noires.

Habitat

Localisé dans les clairières, prairies humides et lisières des bois entre 700 et 2 800 mètres d'altitude.

Période



Visible de mai à août, parfois encore en septembre.

Comportement

Vol lent et planant, uniquement par beau temps.

Espèce fragile, vulnérable au changement climatique et aux activités humaines, sa population est en déclin en France.

Le saviez vous ?

Après l'accouplement, le mâle dépose une petite pièce de cire sur l'abdomen de la femelle pour éviter qu'elle se reproduise avec un autre mâle. Cela s'appelle une **sphragis** — comportement partagé par l'Apollon également (*Parnassius apollo*).